AMFLEE® combo

*Fipronilo, **(S)-metopreno***

AMFLEE combo solución spot-on para perros, gatos y urones

Composición: Cada pipeta de 0,5 ml contiene 50 mg de fipronilo y 60 mg de (S)-metopreno. Cada pipeta de 0,67 ml contiene 67 mg de fipronilo y 60,3 mg de (S)-metopreno. Cada pipeta de 0,67 ml contiene 67 mg de fipronilo y 60,3 mg de (S)-metopreno. Cada pipeta de 1,34 ml contiene 134 mg de fipronilo y 120,6 mg de (S)-metopreno. Cada pipeta de 2,68 ml contiene 268 mg de fipronilo y 241,2 mg de (S)-metopreno. **Indicaciones:** Perros: para usar contra las infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. Tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.). La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante 8 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) que se originan de huevos puestos por pulgas adultas durante ocho semanas después de la aplicación. Tratamiento de infestaciones por garrapatas *(Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus)*. El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida que persiste hasta 4 semanas frente a garrapatas. Tratamiento de infestaciones por piojos picadores *(Trichodectes canis)*. El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP), que haya sido previamente diagnosticada por un veterinario. Gatos: puede usarse contra las infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. Eliminación de pulgas (*Ctenocephalides* spp.). La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante 4 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) que se originan de huevos puestos por pulgas adultas durante seis semanas después de la aplicación. Eliminación de garrapatas *(Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus)*. El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida que persiste hasta 2 semanas frente a garrapatas. Eliminación de piojos picadores *(Felicola subrostratus)*. El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP), que haya sido previamente diagnosticada por un veterinario. Hurones: Puede usarse contra las infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas. Eliminación de pulgas (*Ctenocephalides* spp.). La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante 4 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) que se originan de huevos puestos por pulgas adultas. Eliminación de garrapatas *(Ixodes ricinus)*. El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida que persiste durante 4 semanas frente a garrapatas. **Contraindicaciones:** En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe usarse en cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 2 kg y gatitos de menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 1 kg. El medicamento veterinario no debe usarse en hurones de menos de 6 meses de edad. No usar en animales enfermos (ej. enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes. No usar en conejos, debido al riesgo de reacciones adversas o incluso de muerte. No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. **Especies de destino:** perros, gatos, hurones.



En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas.

Posología y vía de administración: Sólo uso externo, unción dorsal puntual. **Método de administración:** Extraer la pipeta de su envase. Sujetar la pipeta en posición vertical, girar y tirar del tapón. Girar el tapón sobre sí mismo y colocar su otro extremo sobre la pipeta. Presionar y girar el tapón para romper el sellado, y retirar el tapón de la pipeta. Separar el pelo del animal por la base del cuello frente a las escápulas hasta hacer visible la piel. Situar la punta de la pipeta en la piel y apretar la pipeta varias veces hasta vaciar por completo su contenido directamente sobre la piel en un único punto. **Sobredosificación:** El riesgo de presentarse reacciones adversas puede aumentar cuando se sobredosifica. Perros: No se han observado reacciones adversas en estudios de seguridad realizados en la especie de destino, en cachorros de 8 semanas de edad y mayores y de peso aproximadamente 2 kg tratados una vez a cinco veces la dosis recomendada. El riesgo de experimentar reacciones adversas (ver sección 4.6) puede aún así incrementarse cuando se sobredosifica, así que los animales deben ser tratados siempre con el tamaño de pipeta adecuado a su peso corporal. Gatos: No se han observado reacciones adversas en estudios de seguridad realizados en la especie de destino, en gatos y gatitos de 8 semanas de edad y mayores y de peso aproximadamente 1 kg tratados una vez al mes a cinco veces la dosis recomendada durante 6 meses consecutivos. Después del tratamiento puede aparecer picor. La aplicación de una sobredosificación del medicamento veterinario puede causar aspecto pegajoso del pelo en el punto de aplicación. No obstante, si ocurriera esto, desaparecerá dentro de las 24 horas después del tratamiento. Hurones: En hurones de 6 meses de edad y mayores y tratados una vez cada 2 semanas durante 4 tratamientos, a cinco veces la dosis recomendada, se observó pérdida de peso corporal en algunos animales. **Advertencias especiales para cada especie de destino:** Las pulgas de las mascotas a menudo infestan las cestas, camas y zonas de descanso habitual del animal, tales como alfombras y muebles, que deben tratarse en el caso de infestación masiva y al inicio de las medidas de control, con un insecticida adecuado y aspiradas regularmente. Se debe evitar el baño o inmersión en agua en los 2 días después de la aplicación del medicamento veterinario y se deben evitar los baños más de una vez a la semana, debido a que no se han llevado a cabo estudios para investigar cómo esto afecta a la eficacia del medicamento veterinario. Los champús emolientes se pueden usar previos al tratamiento, pero reducen la duración de la protección contra pulgas a aproximadamente 5 semanas cuando se usa semanalmente después de la aplicación del medicamento veterinario. Los baños semanales con champú al 2% de clorexidina no afectan a la eficacia contra pulgas durante un estudio a largo plazo de 6 semanas. Puede haber una adhesión de unas pocas garrapatas. Por esta razón, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfavorables. No hay datos disponibles sobre el efecto de baño/champú en la eficacia del medicamento veterinario en gatos y hurones. **Precauciones especiales de uso:** Precauciones especiales para su uso en animales: Evite el contacto con los ojos del animal. Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario se aplica en un área donde el animal no pueda lamerse y de que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Este medicamento veterinario puede causar irritación ocular, de la piel y de la mucosa. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del medicamento veterinario con la boca, la piel y los ojos. Las personas con hipersensibilidad conocida a los insecticidas o al alcohol deben evitar el contacto con este medicamento veterinario. Evitar que el contenido entre en contacto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse las manos con agua y jabón. Después de la exposición ocular accidental, aclarar el ojo suavemente con agua limpia. Lavarse las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. No fumar, beber o comer durante la aplicación. Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto de aplicación esté seco, y no se debe permitir a los niños jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación esté seco. Por lo tanto se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino al atardecer, y que estos animales recientemente tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños. Otras precauciones: No se puede permitir nadar a los perros en cursos de agua en los 2 días siguientes después de la aplicación. **Reacciones adversas (frecuencia y gravedad):** No sobredosificar. En caso de lamido en el punto de aplicación, puede observarse un breve periodo de salivación excesiva debido principalmente a la naturaleza del excipiente. Perros y gatos: Entre las reacciones adversas muy raras que se han comunicado después del uso se encuentran: reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (descamación , pérdida de pelo local, picor, enrojecimiento) así como picor general o pérdida de pelo. Tras la administración, también se ha observado salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (aumento de sensibilidad a la estimulación , depresión, otros signos nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios. **Uso durante la gestación, la lactancia ola puesta:** Perros: Se puede usar durante la gestación y la lactancia. Gatos: El medicamento veterinario se puede usar durante la gestación. No se ha documentado la toxicidad potencial del medicamento veterinario en gatitos de menos de 8 semanas de edad en contacto con la madre tratada. Se debe tener especial cuidado en este caso. Hurones: Los estudios de laboratorio efectuados en gatos no han demostrado efectos teratogénicos, tóxicos para el feto o tóxicos para la madre. La seguridad del medicamento veterinario no ha sido establecida en hurones durante la gestación y la lactancia. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Ninguna conocida. **Tiempo de espera:** No procede. **Incompatibilidades:** Ninguna conocida. **Periodo de validez:** Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años. **Precauciones especiales de conservación:** Conservar en el envase original con objeto de protegerlo de la luz y la humedad. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. **Naturaleza y composición del envase primario:** Pipeta unidosis de polipropileno blanco con cierre de polietileno o polioximetileno empaquetado en bolsa de triplex laminado compuesto de poliéster, aluminio y polietileno. Caja de cartón conteniendo 1, 3, 6, 10, 30 pipetas. **Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso:** Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. El fipronilo y el (S)-metopreno pueden afectar adversamente a algunos organismos acuáticos. No contaminar estanques, arroyos o acequias con el medicamento veterinario o con los envases vacíos. **Titular de la autorización de comercialización:** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Eslovenia. **Números de la autorización de comercialización:** 3429 ESP, 3430 ESP, 3431 ESP, 3432 ESP.

Uso exclusivamente veterinario. Consulte la ficha técnica completa antes de recetar el medicamento.

Referencias bibliográficas:
1. AMFLEE Combo Summary of Product Characteristics
2. Dryden MW. The Problem with Fleas: Managing Persistent Flea Infections in: Western Veterinary Conference 2013.

Krka, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto, Slovenia
www.krka.si

Labiana Life Sciences S.A., C/ Venus, 26,
08228 Terrassa, (Barcelona), España
Teléfono: +34 937 36 97 00, www.labiana.com

ISFM easy to give
www.icatcare.org/vets

Abril 2019, 236-2019

NUEVO

ISFM easy to give
www.icatcare.org/vets

AMFLEE® combo

*Fipronilo, **(S)-metopreno***

¡Protección en el lugar adecuado!

Eficaz contra +

LabianaPets
www.labianapets.com

¡La combinación ganadora frente a pulgas y garrapatas!

AMFLEE® COMBO
CONTIENE FIPRONILO Y (S)-METOPRENO

+ Elimina las pulgas adultas, los huevos y las larvas. (1)



El uso de productos que actúan sobre las pulgas adultas y sus estadios inmaduros forma parte del control integrado frente a las pulgas. (2)

+ Evita la contaminación del entorno de los animales tratados con los estadios inmaduros de las pulgas. (1)

+ AMFLEE® Combo elimina garrapatas y malófagos en las **48 horas** posteriores a la aplicación. (1)

AMFLEE® COMBO
ES UN PRODUCTO PRÁCTICO Y SEGURO

+ Pipetas con un diseño ergonómico que posibilita una aplicación rápida, fácil y segura.

+ Amflee Combo es resistente al agua.*

* Deben evitarse los baños/la inmersión en agua durante los 2 días previos y posteriores a la aplicación del producto y también una frecuencia de baño superior a una vez por semana.

Amflee® Combo ha sido premiado por la International Cat Care Society, gracias a las mejoras introducidas en su envase, para proporcionar una aplicación fácil y sin estrés en la mascota.

- Fácil de abrir (sin necesidad de tijeras).
- La pipeta se puede volver a cerrar si el animal se aleja durante la aplicación.
- Envases más blandos para poder apretarlos más fácilmente y vaciar todo el contenido.
- No produce ningún daño en la superficie de la piel del animal, ya que no tiene bordes afilados.
- Membrana mejorada en la punta de la pipeta para poder romper el precinto con más facilidad y permitir un vaciado más suave del contenido.
- Sin fugas.

+ Amflee Combo es seguro para cachorros y gatitos a partir de las 8 semanas de edad y en hembras gestantes y en periodo de lactancia. (1)